附件二：各套餐新增体检项目

套餐一（核定价 1000 元/人）					
项目	项目内容	意义/要求	男/男-45 岁以上	女未婚	女已婚
心血管科	心肌酶 4 项	血清乳酸脱氢酶测定（LD）、血清肌酸激酶测定（CK）、血清肌酸激酶同工酶（CK-MB）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）	□	□	□
彩超	颈动脉	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	□	□	□
甲功能检查	三碘甲状腺原氨酸（T3）	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	□	□	□
	甲状腺素（T4）		□	□	□
	促甲状腺激素（TSH）		□	□	□
	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）		□	□	□
	游离甲状腺素（FT4）		□	□	□
传染病检查	艾滋病毒抗体(HIV-Ab)	辅助诊断艾滋病	□	□	□
	梅毒螺旋体抗体初筛(Anti-TP)	为梅毒螺旋体侵入人体后出现的特异性抗体。	□	□	□
鼻咽癌检查	EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体测定（发光法）	可作为临床辅助诊断鼻咽癌的一种可靠方法,也可作为观察患者病情发展的有益指标,在临床上有较大的意义	□	□	□
肿瘤标志物	全身肿瘤标志物	需包括不限于以下项：癌胚抗原定量(CEA)、甲胎蛋白定量(AFP)、胃蛋白酶原二项(Ⅰ及Ⅱ)、前列腺肿瘤标志物组合、癌抗原 242(CA242)、癌抗原 125(CA125)、癌抗原 19-9(CA19-9)、癌抗原 15-3(CA15-3)、癌抗原 50(CA50)、癌抗原 724(CA-724)等	□	□	□
胃功能检查	胃蛋白酶原Ⅰ	反映胃粘膜的变化，是诊断胃部病变的辅助依据。胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ比值低于正常值时，对慢性萎缩性胃炎特异性较高	□	□	□
	胃蛋白酶原Ⅱ		□	□	□
	胃蛋白酶原比值		□	□	□

套餐二（核定价 1200 元/人）					
项目	项目内容	意义/要求	男/男-45 岁以上	女未婚	女已婚
心血管科	心肌酶 4 项	血清乳酸脱氢酶测定（LD）、血清肌酸激酶测定（CK）、血清肌酸激酶同工酶（CK-MB）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）	□	□	□
彩超	颈动脉	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	□	□	□
	心脏超声检查	通过彩色超声仪器能动态显示心腔内结构、心脏搏动和各瓣膜的血流情况，是诊断各种心脏病的重要手段之一	□	□	□
甲功能检查	三碘甲状腺原氨酸（T3）	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	□	□	□
	甲状腺素（T4）		□	□	□
	促甲状腺激素（TSH）		□	□	□
	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）		□	□	□
	游离甲状腺素（FT4）		□	□	□
传染病检查	艾滋病毒抗体(HIV-Ab)	辅助诊断艾滋病。	□	□	□
	梅毒螺旋体抗体初筛(Anti-TP)	为梅毒螺旋体侵入人体后出现的特异性抗体。	□	□	□
鼻咽癌检查	EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体测定（发光法）	可作为临床辅助诊断鼻咽癌的一种可靠方法,也可作为观察患者病情发展的有益指标,在临床上有较大的意义	□	□	□
肿瘤标志物	全身肿瘤标志物	需包括不限于以下项：癌胚抗原定量(CEA)、甲胎蛋白定量(AFP)、胃蛋白酶原二项(Ⅰ及Ⅱ)、前列腺肿瘤标志物组合、癌抗原 242(CA242)、癌抗原 125(CA125)、癌抗原 19-9(CA19-9)、癌抗原 15-3(CA15-3)、癌抗原 50(CA50)、癌抗原 724(CA-724)等	□	□	□
免疫测定	抗链球菌溶血素 O 测定	可检测溶血性链球菌感染。	□	□	□
	类风湿关节炎因子（RF）	是诊断类风湿关节炎的重要诊断指标。	□	□	□

	单项补体测定（C3）	可诊断组织损伤、炎症、感染、传染病早期等。	□	□	□
	单项补体测定（C4）	可诊断皮肌炎、感染、各种恶性肿瘤、自身免疫性溶血性贫血等。	□	□	□
	免疫球蛋白测定 IgG	反映机体的体液免疫功能状态，有助于感染性疾病、免疫增生性疾病和免疫缺陷病等的鉴别诊断、疾病监控和预后。	□	□	□
	免疫球蛋白测定 IgA		□	□	□
	免疫球蛋白测定 IgM		□	□	□
胃功能检查	胃蛋白酶原 I	反映胃粘膜的变化，是诊断胃部病变的辅助依据。胃蛋白酶原 I/胃蛋白酶原 II 比值低于正常值时，对慢性萎缩性胃炎特异性较高	□	□	□
	胃蛋白酶原 II		□	□	□
	胃蛋白酶原比值		□	□	□

套餐三（核定价 2000 元/人）					
项目	项目内容	意义/要求	男/男-45岁以上	女未婚	女已婚
心血管科	心肌酶 4 项	血清乳酸脱氢酶测定（LD）、血清肌酸激酶测定（CK）、血清肌酸激酶同工酶（CK-MB）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）	□	□	□
血液科	超敏C反应蛋白	C 反应蛋白是由肝脏合成的一种全身性炎症反应急性期的非特异性标志物，是心血管事件危险最强有力的预测因子之一。	□	□	□
经颅多普勒	脑血管血流检测（TCD）	了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。	□	□	□
彩超	颈动脉	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	□	□	□
	心脏超声检查	通过彩色超声仪器能动态显示心腔内结构、心脏搏动和各瓣膜的血流情况，是诊断各种心脏病的重要手段之一	□	□	□
	双肾输尿管膀胱彩超	通过彩色超声检查泌尿系统：肾脏、膀胱、输尿管等器官各种形态及病理改变（如肿瘤、结石、积水、增生等），可提供高清晰度的动态超声诊断。	□	□	□
磁共振扫描（MRI）	颅脑 MRI 平扫（不出片）	头颅 MRI 可直接显示颅神经，发现神经上的早期病变，头颅 MRI 检查无颅骨伪影，脑灰白质信号对比度高，使得头颅 MRI 检查明显优于 CT。	□	□	□
CT	低剂量螺旋 CT 肺部	肺癌人早期筛查，CT 具有扫描速度快，覆盖面积大，采集信息量多等优点，在短时间内能够对全身各脏器进行检查，可以进行多平面的重建和重组对病变达到准确的定位、定性、定量的诊断；特别是对早期病变的发现及诊断，疾病治疗后的疗效判定，良恶性病变的鉴别等有着显著的临床意义。	□	□	□
动脉硬化检测	动脉硬化检测	对人体动脉血管做总体性评估，便于早发现动脉硬化。	□	□	□
骨密度	骨密度检测（经脚踝）	早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	□	□	□
甲功能检查	三碘甲状腺原氨酸（T3）	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	□	□	□

	甲状腺素（T4）		□	□	□
	促甲状腺激素（TSH）		□	□	□
	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)		□	□	□
	游离甲状腺素（FT4）		□	□	□
传染病检查	艾滋病毒抗体(HIV-Ab)	辅助诊断艾滋病。	□	□	□
	梅毒螺旋体抗体初筛(Anti-TP)	为梅毒螺旋体侵入人体后出现的特异性抗体。	□	□	□
鼻咽癌检查	EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体测定（发光法）	可作为临床辅助诊断鼻咽癌的一种可靠方法,也可作为观察患者病情发展的有益指标,在临床上有较大的意义	□	□	□
肿瘤标志物	全身肿瘤标志物（12 项）	需包括以下 12 项：癌胚抗原定量(CEA)、甲胎蛋白定量(AFP)、胃蛋白酶原二项(Ⅰ及Ⅱ)、前列腺肿瘤标志物组合、癌抗原 242(CA242)、癌抗原 125(CA125)、癌抗原 19-9(CA19-9)、癌抗原 15-3(CA15-3)、癌抗原 50(CA50)、癌抗原 724(CA-724)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、细胞角蛋白(Cyfra21-1)	□	□	□
免疫测定	抗链球菌溶血素 O 测定	可检测溶血性链球菌感染。	□	□	□
	类风湿关节炎因子（RF）	是诊断类风湿关节炎的重要诊断指标。	□	□	□
	单项补体测定（C3）	可诊断组织损伤、炎症、感染、传染病早期等。	□	□	□
	单项补体测定（C4）	可诊断皮肌炎、感染、各种恶性肿瘤、自身免疫性溶血性贫血等。	□	□	□
	免疫球蛋白测定 IgG	反映机体的体液免疫功能状态，有助于感染性疾病、免疫增生性疾病和免疫缺陷病等的鉴别诊断、疾病监控和预后。	□	□	□
	免疫球蛋白测定 IgA		□	□	□
	免疫球蛋白测定 IgM		□	□	□
胃功能检查	胃蛋白酶原 I	反映胃粘膜的变化，是诊断胃部病变的辅助依据。胃蛋白酶原 I/胃蛋白酶原 II 比值低于正常值时，对慢性萎缩性胃炎特异性较高	□	□	□
	胃蛋白酶原 II		□	□	□
	胃蛋白酶原比值		□	□	□